

## 山崎断層帯・那岐山断層帯の長期評価(一部改訂)

山崎（やまさき）断層帯は、岡山県東部から兵庫県南東部にかけて分布する活断層帯である。那岐山（なぎせん）断層帯は、岡山県東部に分布する活断層帯であり、その東端は山崎断層帯に近接する。ここでは、平成 7 年度に岡山県によって行われた調査、平成 7 年度から 12 年度にかけて兵庫県によって行われた調査及び平成 19 年度に産業技術総合研究所によって行われた調査をはじめ、これまでに行われた調査研究成果に基づいて、草谷（くさだに）断層を含めた山崎断層帯と、那岐山断層帯の諸特性を次のように評価した。<sup>※1</sup>

### 1. 断層帯の位置及び形態

山崎断層帯は、山崎断層帯主部と草谷断層の 2 つの起震断層に区分される（図 1、図 2）。

#### （1）山崎断層帯主部

山崎断層帯主部は岡山県勝田郡奈義（なぎ）町から兵庫県三木市に至る断層帯で、ほぼ西北西－東南東方向に一連の断層が連なるように分布している。全体の長さは約 85 km の可能性があり、左横ずれが卓越する断層帯である（表 1）。

なお、山崎断層帯主部は、兵庫県姫路市より北西側と兵庫県神崎（かんだき）郡福崎町より南東側とではそれぞれ最新活動時期が異なる。このため、ここでは活動区間を北西部区間及び南東部区間に分けて評価を行った（図 2、表 1、表 2）。

#### （2）草谷断層

草谷断層は、兵庫県三木市から兵庫県加古川市にかけて分布する断層である。長さは約 13 km の可能性があり、東北東－西南西方向に延びる右横ずれが卓越する断層である（表 3）。

#### （3）那岐山断層帯

那岐山断層帯は、岡山県苫田（とまた）郡鏡野町から岡山県勝田郡奈義町に至る断層帯である。長さは約 29 km の可能性があり、ほぼ東西方向に延びており、断層帯の

<sup>※1</sup> 山崎断層帯・那岐山断層帯については、地震調査研究推進本部地震調査委員会（2013）により、これまでに行われた調査結果に基づいて山崎断層帯として長期評価が公表されている。ここでは震源分布図及び放射性炭素同位体年代（<sup>14</sup>C 年代）の暦年補正を除いて、2018 年までに公表された調査研究成果を整理し、構成断層の位置形状・地下構造・活動様式・活動間隔などの違いという観点から断層帯の区分を見直した結果、本断層帯を山崎断層帯・那岐山断層帯に二分し、両断層帯の評価を行った。なお、今回の評価に際しては、必ずしも 2018 年までに公表されたすべての調査研究成果を網羅しているわけではないことに留意されたい。

北側が南側に対して相対的に隆起すると推定される（表5）。

## 2. 断層帯の過去の活動

### （1）山崎断層帯主部

北西部区間の平均的な左横ずれ速度は約1 m／千年で、最新の活動時期は868年の地震であったと推定され、1つ前の活動時期は約3千4百年前以後、約2千9百年前以前であった可能性がある。活動時の左横ずれの量は2－6 m程度で、平均活動間隔は1千7百－2千2百年程度であった可能性がある（表1）。

また、南東部区間の平均的な左横ずれ速度は、0.8m／千年程度であった可能性がある。最新の活動時期は5世紀以後、6世紀以前と推定され、平均活動間隔は3千9百年程度であった可能性がある（表1）。

### （2）草谷断層

草谷断層の平均的な右横ずれ速度は、約0.2m／千年であった可能性がある。最新の活動時期は5世紀以後、12世紀以前と推定され、平均活動間隔は6千5百年程度であった可能性がある（表3）。

### （3）那岐山断層帯

那岐山断層帯の平均的な上下方向のずれの速度は約0.06－0.09m／千年であった可能性があるが、最新活動時期の正確な年代は不明である。また、既往の研究成果による直接的なデータではないが、経験則から求めた1回のずれの量と平均的なずれの速度に基づくと、平均活動間隔は2万3千－4万8千年程度であった可能性がある（表5）。

## 3. 断層帯の将来の活動

### （1）山崎断層帯主部

北西部区間では、マグニチュード(M)7.8程度の地震が発生する可能性があり、そのときの左横ずれ量は2－6 m程度となる可能性がある（表1）。

南東部区間では、M7.3程度の地震が発生する可能性があり、そのときの左横ずれ量は3 m程度となる可能性がある（表1）。

なお、山崎断層帯主部全体が連動して活動することも考えられる。その場合、M8.0程度の地震が発生する可能性がある。

山崎断層帯において将来このような地震が発生する長期確率は表2に示すとおりである。山崎断層帯主部全体が連動して活動する場合の地震発生確率は、北西部区間と南東部区間それぞれの地震発生確率を超えないと考えられる。

本評価で得られた地震発生長期確率には幅があるが、その最大値をとると、北西部区間は今後30年の間に地震が発生する確率が我が国の主な活断層の中ではやや高いグループに属することになる（注1、注2）。

### （2）草谷断層

草谷断層では、M6.7程度の地震が発生する可能性があり、そのときの右横ずれの量は1 m程度となる可能性がある（表3）。

草谷断層において将来このような地震が発生する長期確率は表4に示すとおりである。

### （3）那岐山断層帯

那岐山断層帯では、M7.3程度の地震が発生する可能性があり、そのとき断層帯の北側が南側に対して2－3 m程度隆起する可能性がある（表5）。

那岐山断層帯は、最新活動時期が判明していないので、最新活動後の経過率は不明であり、信頼度は低いが、将来このような地震が発生する長期確率は表6に示すとおりである。

## 4. 今後に向けて

今回の評価では、山崎断層帯・那岐山断層帯の構成断層の位置形状・活動様式・活動間隔などの違いという観点から断層帯の活動区間の区分を改めて検討した結果、これまで地震調査研究推進本部地震調査委員会（2013）が山崎断層帯として一括して評価した断層帯を、山崎断層帯・那岐山断層帯に二分し、それぞれの断層帯の評価を行った。ただし、地震調査研究推進本部地震調査委員会（2013）においても、両者は別の起震断層であると述べられている。今回の評価では両者を明確に分けて評価を行っているが、その内容は従来の評価から大幅に改訂されたわけではない。

山崎断層帯・那岐山断層帯の長期評価について次のような課題が残されている。

山崎断層帯主部では、全体的に平均活動間隔に関する信頼性の高いデータが得られていない。また、本断層帯の南東部区間は、その形状が明瞭ではなく、北西部区間と最新活動時期が異なる上に、三木断層については過去の活動履歴に関する信頼性が低いと考えられる。南東部区間と北西部区間の位置関係及び連動の有無を明らかにする観点並びに活動履歴の信頼性を向上させる観点から、更なる調査が必要である。

草谷断層では、平均活動間隔の信頼性が低い上に、最新活動時期も十分絞り込まれていないため、これらの信頼性を向上させる観点で更なる調査が必要である。

那岐山断層帯は、過去の活動履歴がほとんど知られていないことから、過去の活動履歴全般について更なる調査が必要である。




図1 山崎断層帯・那岐山断層帯の概略位置図  
(長方形は図2の範囲)



表 1 山崎断層帯主部の特性

| 項 目             | 特 性                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 信頼度<br>(注 3)                                                                  | 根 拠<br>(注 4)                                                                                                                                          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 断層帯の位置・形態    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                       |
| (1) 断層帯を構成する断層  | (北西部区間)<br>大原断層、土万（ひじま）断層、安富（やすとみ）断層、暮坂峠（くれさかとうげ）断層<br>(南東部区間)<br>琵琶甲断層、三木断層                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                               | 文献 2、10による。                                                                                                                                           |
| (2) 断層帯の位置・形状   | <p>地表における断層帯の位置・形状</p> <p>断層帯の位置<br/>(北西部区間)<br/>(北西端) 北緯35° 10.9′ 東経134° 12.6′<br/>(南東端) 北緯34° 53.5′ 東経134° 43.8′<br/>(南東部区間)<br/>(北西端) 北緯34° 57.8′ 東経134° 45.2′<br/>(南東端) 北緯34° 47.2′ 東経135° 0.7′</p> <p>長さ 約85 km<br/>うち北西部区間 約57 km<br/>南東部区間 約31 km</p> <p>一般走向 N59° W<br/>(北西部区間) N56° W<br/>(南東部区間) N50° W</p> | <p>△<br/>△<br/><br/>△<br/>△<br/><br/>△<br/>△<br/>△<br/><br/>◎<br/>◎<br/>◎</p> | <p>文献 1、3、8、11、12、13による。<br/>端点位置及び長さは図 2 から計測。</p> <p>断層帯の両端を直線で結んだ方向。</p>                                                                           |
|                 | <p>地下における断層面の位置・形状</p> <p>長さ及び上端の位置<br/>(両区間とも) 地表での長さ・位置と同じ</p> <p>上端の深さ (両区間とも) 0 km</p> <p>傾斜<br/>(両区間とも) ほぼ垂直 (地表近傍)</p> <p>下端の深さ<br/>(両区間とも) 18 km程度</p> <p>幅<br/>(両区間とも) 18 km程度</p>                                                                                                                            | <p>○<br/><br/>◎<br/><br/>◎<br/><br/>○<br/><br/>△</p>                          | <p>上端の深さが 0 km であることから推定。<br/>断層露頭が各地で見られることによる。</p> <p>変位地形調査、反射法弾性波探査、トレンチ調査等の結果から推定。<br/>地震発生層の下限 (D100) から推定。<br/>(注 5)<br/>断層面の傾斜と下端の深さから推定。</p> |
| (3) 断層のずれの向きと種類 | 左横ずれ断層<br>(北東側隆起の上下成分を伴う)                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ◎                                                                             | 文献 2 などに示される変位地形調査の結果による。                                                                                                                             |
| 2. 断層帯の過去の活動    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                                                                       |
| (1) 平均的なずれの速度   | <p>(北西部区間)<br/>約 1 m/千年 (左横ずれ成分)<br/>0.1 m/千年程度以下 (上下成分)</p> <p>(南東部区間)<br/>0.8 m/千年程度 (左横ずれ成分)</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>○<br/>△<br/><br/>△</p>                                                     | <p>文献 15 による。<br/>文献 4 による。</p> <p>文献 5、10による。</p>                                                                                                    |

|                        |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | 0.03－0.1m／千年程度（上下成分）                                                                                                                               | △                                                                                                                                                                                                              | 文献5、10、14による。                                                                                                                                           |
| (2) 過去の活動時期            | (北西部区間)<br>活動1（最新活動）<br>868年の地震<br>（トレンチ調査に基づくと9－13世紀）<br>活動2（1つ前の活動）<br>約3千4百年前以後、約2千9百年前以前<br><br>(南東部区間)<br>活動1（最新活動）<br>5世紀以後、6世紀以前            | ○<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>△<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>○                                                                                                                            | 文献4、18による。<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>文献6、17による。<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>文献6、16、19による。                                       |
| (3) 1回のずれの量と平均活動間隔     | 1回のずれの量<br>(北西部区間)<br>2－6m程度（左横ずれ成分）<br>(南東部区間)<br>3m程度（左横ずれ成分）<br><br>平均活動間隔<br>(北西部区間) 1千7百－2千2百年程度<br>(南東部区間) 3千9百年程度                           | △<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>△<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>△<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>△                                                                                   | 文献15及び断層の長さから推定。<br>断層の長さから推定。<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>過去2回の活動より推定。<br>平均的なずれの速度及び1回のずれの量から推定。                                           |
| (4) 過去の活動区間            | 北西部区間及び南東部区間の2区間                                                                                                                                   | ○                                                                                                                                                                                                              | 最新活動時期の違いから推定。                                                                                                                                          |
| 3. 断層帯の将来の活動           |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |
| (1) 将来の活動区間及び活動時の地震の規模 | 活動区間 2区間<br>(北西部区間)<br>地震の規模 M7.8程度<br><br>ずれの量 2－6m程度（左横ずれ成分）<br><br>(南東部区間)<br>地震の規模 M7.3程度<br><br>ずれの量 3m程度（左横ずれ成分）<br><br>(全体)<br>地震の規模 M8.0程度 | ○<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>△<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>△<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>△<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>△<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>△ | 断層の長さから推定。<br>文献15及び断層の長さから推定。<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>断層の長さから推定。<br>断層の長さから推定。（説明文参照）<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>断層の長さから推定。 |

表2 山崎断層帯主部の将来の地震発生確率等

| 項 目                    | 将来の地震発生確率等<br>(注6) | 信頼度<br>(注<br>7) | 備 考                 |
|------------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| (北西部区間)<br>地震後経過率 (注8) | A*ランク<br>0.5－0.7   | b               | 発生確率及び集積確率は、文献9による。 |
| 今後 30年以内の地震発生確率        | 0.2％－2％            |                 |                     |
| 今後 50年以内の地震発生確率        | 0.3％－3％            |                 |                     |
| 今後100年以内の地震発生確率        | 0.8％－6％            |                 |                     |
| 今後300年以内の地震発生確率        | 5％－20％             |                 |                     |
| 集積確率 (注9)              | 0.4％－7％            |                 |                     |
| (南東部区間)<br>地震後経過率 (注8) | Zランク<br>0.4        | b               |                     |
| 今後 30年以内の地震発生確率        | ほぼ0％－0.005％        |                 |                     |
| 今後 50年以内の地震発生確率        | 0.001％－0.008％      |                 |                     |
| 今後100年以内の地震発生確率        | 0.003％－0.02％       |                 |                     |
| 今後300年以内の地震発生確率        | 0.03％－0.2％         |                 |                     |
| 集積確率 (注9)              | ほぼ0％－0.01％         |                 |                     |



表3 草谷断層の特性

| 項 目                    | 特 性                                                                                                                        | 信頼度<br>(注3)                   | 根 拠<br>(注4)                                                                         |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 断層の位置・形態            |                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| (1) 構成する断層             | 草谷（くさだに）断層                                                                                                                 |                               | 文献5による。                                                                             |
| (2) 断層の位置・形状           | 地表における断層の位置・形状<br>断層の位置<br>(北東端) 北緯34° 47.2′ 東経135° 0.6′<br>(南西端) 北緯34° 43.6′ 東経134° 53.2′<br><br>長さ 約13 km<br>一般走向 N59° E | △<br>◎<br><br>△<br>◎          | 文献5、14による。<br>位置及び長さは図2から計測。<br><br>一般走向は、断層の両端を直線で結んだ方向。                           |
|                        | 地下における断層面の位置・形状<br>長さ及び上端の位置<br>地表での長さ・位置と同じ<br><br>上端の深さ 0 km<br>傾斜 ほぼ垂直（地表近傍）<br>下端の深さ 13 km程度<br><br>幅 13 km程度          | ○<br><br>◎<br>○<br>△<br><br>△ | 上端の深さが0 kmであることから推定。<br><br>文献5による。<br>地震発生層の下限(D100)から推定。(注5)<br>断層面の傾斜と下端の深さから推定。 |
| (3) 断層のずれの向きと種類        | 右横ずれ断層<br>(北西側隆起の上下成分を伴う)                                                                                                  | ◎                             | 文献5による。                                                                             |
| 2. 断層の過去の活動            |                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| (1) 平均的なずれの速度          | 約0.2m/千年（右横ずれ成分）                                                                                                           | △                             | 文献1、8、14による。                                                                        |
| (2) 過去の活動時期            | 活動1（最新活動）<br>5世紀以後、12世紀以前                                                                                                  | ○                             | 文献6、7による。                                                                           |
| (3) 1回のずれの量と平均活動間隔     | 1回のずれの量 1 m程度（右横ずれ成分）                                                                                                      | △                             | 断層の長さから推定。<br>平均的なずれの速度と1回のずれの量から推定。                                                |
|                        | 平均活動間隔 6千5百年程度                                                                                                             | △                             |                                                                                     |
| (4) 過去の活動区間            | 断層全体で1区間                                                                                                                   | ○                             |                                                                                     |
| 3. 断層の将来の活動            |                                                                                                                            |                               |                                                                                     |
| (1) 将来の活動区間及び活動時の地震の規模 | 活動区間 断層全体で1区間<br>地震の規模 M6.7程度<br>ずれの量 1 m程度（右横ずれ成分）                                                                        | △<br>▲<br>△                   | 断層の長さから推定。(注10)<br>断層の長さから推定。                                                       |

表 4 草谷断層の将来の地震発生確率等

| 項 目             | 将来の地震発生確率等<br>(注 6) | 信頼度<br>(注 7) | 備 考                   |
|-----------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 地震後経過率 (注 8)    | Z ランク<br>0.1－0.3    | b            | 発生確率及び集積確率は、文献 9 による。 |
| 今後 30年以内の地震発生確率 | ほぼ 0 %              |              |                       |
| 今後 50年以内の地震発生確率 | ほぼ 0 %              |              |                       |
| 今後100年以内の地震発生確率 | ほぼ 0 %              |              |                       |
| 今後300年以内の地震発生確率 | ほぼ 0 %              |              |                       |
| 集積確率 (注 9)      | ほぼ 0 %              |              |                       |

表5 那岐山断層帯の特性

| 項 目                    | 特 性                                                                                                                     | 信頼度<br>(注 3)                      | 根 拠<br>(注 4)                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 断層帯の位置・形態           |                                                                                                                         |                                   |                                                                                  |
| (1) 断層帯を構成する断層         | 津山北方の断層（注11）、那岐山（なぎせん）断層                                                                                                |                                   | 文献 2、8、10による。                                                                    |
| (2) 断層帯の位置・形状          | 地表における断層帯の位置・形状<br>断層帯の位置<br>（西端）北緯35° 7.6′ 東経133° 54.1′<br>（東端）北緯35° 9.3′ 東経134° 12.9′<br><br>長さ 約29 km<br>一般走向 N84° E | △<br>△<br><br>△<br>◎              | 文献13、及び地震調査研究推進本部地震調査委員会での審議結果による。<br>位置及び長さは図 2 から計測。<br>一般走向は、断層帯の両端を直線で結んだ方向。 |
|                        | 地下における断層面の位置・形状<br>長さ及び上端の位置<br>地表での長さ・位置と同じ<br><br>上端の深さ 0 km<br><br>傾斜 不明<br>下端の深さ 16 km程度<br><br>幅 不明                | ◎<br><br>◎<br><br>—<br>△<br><br>— | 上端の深さが 0 km であることから推定。<br>断層露頭が各地で見られることによる。<br><br>地震発生層の下限（D100）から推定。（注 5）     |
|                        | (3) 断層のずれの向きと種類                                                                                                         | 北側隆起の断層（右横ずれ成分を伴う）                | ○                                                                                |
| 2. 断層帯の過去の活動           |                                                                                                                         |                                   |                                                                                  |
| (1) 平均的なずれの速度          | 約0.06－0.09m／千年（上下成分）                                                                                                    | △                                 | 文献15による。                                                                         |
| (2) 過去の活動時期            | 不明                                                                                                                      | —                                 |                                                                                  |
| (3) 1 回のずれの量と平均活動間隔    | 1 回のずれの量<br>2－3 m 程度（上下成分）<br><br>平均活動間隔<br>2 万 3 千－4 万 8 千年程度                                                          | △<br><br>△                        | 断層の長さから推定。<br>傾斜不明のため傾斜45－90度を仮定。<br>平均的なずれの速度及び 1 回のずれの量から推定。                   |
|                        | (4) 過去の活動区間                                                                                                             | 断層帯全体で 1 区間                       |                                                                                  |
| 3. 断層帯の将来の活動           |                                                                                                                         |                                   |                                                                                  |
| (1) 将来の活動区間及び活動時の地震の規模 | 活動区間 断層帯全体で 1 区間<br>地震の規模 M7.3程度<br>ずれの量 2－3 m 程度（上下成分）                                                                 | △<br>△<br>△                       | 断層の長さから推定。<br>断層の長さから推定。<br>傾斜45－90度を仮定。                                         |

表 6 那岐山断層帯の将来の地震発生確率等 (注12)

| 項 目               | 将来の地震発生確率等<br>(注 6) | 信頼度<br>(注 7) | 備 考                                |
|-------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|
| 地震後経過率 (注 8)      | Aランク<br>不明          |              |                                    |
| 今後 30 年以内の地震発生確率  | 0.06%－0.1%          | d            | 最新活動時期が不明のため、平均活動間隔を基にポアソン過程で推測した。 |
| 今後 50 年以内の地震発生確率  | 0.1%－0.2%           |              |                                    |
| 今後 100 年以内の地震発生確率 | 0.2%－0.4%           |              |                                    |
| 今後 300 年以内の地震発生確率 | 0.6%－1%             |              |                                    |
| 集積確率 (注 9)        | 不明                  |              |                                    |

注 1：地震調査委員会の活断層評価では、活動区間が単独で活動した場合の今後 30 年間の地震発生確率について、次のような相対的な評価を盛り込むこととしている。

今後 30 年間の地震発生確率（最大値）が 3 % 以上の場合：

「本断層帯は、今後 30 年の間に地震が発生する可能性が、我が国の主な活断層の中では高いグループに属することになる」

今後 30 年間の地震発生確率（最大値）が 0.1 % 以上－ 3 % 未満の場合：

「本断層帯は、今後 30 年の間に地震が発生する可能性が、我が国の主な活断層の中ではやや高いグループに属することになる」

なお、2005 年 4 月時点で一通り評価を終えた 98 の主要活断層帯のうち、最新活動時期が判明しており、通常の活断層評価で用いている更新過程（地震の発生確率が時間とともに変動するモデル）により地震発生 of 長期確率を求めたものについては、活動区間が単独で活動した場合の今後 30 年間に地震が発生する確率の割合は以下のとおりになっている。

30 年確率の最大値が 0.1 % 未満：約半数

30 年確率の最大値が 0.1 % 以上－ 3 % 未満：約 1/4

30 年確率の最大値が 3 % 以上：約 1/4

（いずれも 2005 年 4 月時点での算定。確率の評価値に幅がある場合はその最大値を採用。）

注 2：1995 年兵庫県南部地震（地震調査研究推進本部地震調査委員会，2026）、1858 年飛越地震（地震調査研究推進本部地震調査委員会，2004）及び 1847 年善光寺地震（地震調査研究推進本部地震調査委員会，2015）の地震発生直前における 30 年確率と集積確率は以下のとおりである。

| 地震名                      | 活動した活断層                                      | 地震発生直前の<br>30 年確率 (%) | 地震発生直前の<br>集積確率 (%) | 断層の平均活動<br>間隔 (千年) |
|--------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|
| 1995 年兵庫県南部地震<br>(M7.3)  | 六甲・淡路島断層帯<br>淡路島西岸区間<br>「野島断層を含む区<br>間」(兵庫県) | 0.02%－10%             | 0.05%－90%           | 約 1.6－約 3.5        |
| 1858 年飛越地震<br>(M7.0－7.1) | 跡津川断層帯<br>(岐阜県・富山県)                          | ほぼ 0 %－13%            | ほぼ 0 %－90%<br>より大   | 約 1.7－約 3.6        |
| 1847 年善光寺地震<br>(M7.4)    | 長野盆地西縁断層帯<br>(長野県)                           | ほぼ 0 %－20%            | ほぼ 0 %－90%<br>より大   | 約 0.8－約 2.5        |

「長期的な地震発生確率の評価手法について」に示されているように、地震発生確率は前回の地震後、十分長い時間が経過しても 100 % とはならない。その最大値は平均活動間隔に依存し、平均活動間隔が長いほど最大値は小さくなる。平均活動間隔が 3 万年の場合は 30 年確率の最大値は 0.86 % 程度である。

注 3：信頼度は、特性欄に記載されたデータの相対的な信頼性を表すもので、記号の意味は次のとおり。

◎：高い、○中程度、△：低い、▲：かなり低い

注 4：文献については、本文末尾に示す以下の文献。

文献1：千田ほか（2002）  
 文献2：福井（1981）  
 文献3：廣内ほか（2015）  
 文献4：兵庫県（1996）  
 文献5：兵庫県（1999）  
 文献6：兵庫県（2000）  
 文献7：兵庫県（2001）  
 文献8：今泉ほか編（2018）  
 文献9：地震調査研究推進本部地震調査委員会（2001）  
 文献10：活断層研究会編（1991）  
 文献11：松多ほか（2015）  
 文献12：岡田ほか（2002）  
 文献13：岡田ほか（2016）  
 文献14：岡田・東郷編（2000）  
 文献15：岡山県（1996）  
 文献16：産業技術総合研究所（2008）  
 文献17：遠田ほか（1995）  
 文献18：宇佐美ほか（2013）  
 文献19：吉岡ほか（2008）

注5：主要活断層の評価の中では、断層面の下端の深さは、地震観測結果から推定される地震発生層の下限の深さに基づいて推定を行っている。2016年に発生した熊本地震の例では、本震のすべり領域が、上記の方法で推定していた断層面の下端の深さよりも更に5 km程度深い場所まで延びていた可能性が指摘された（例えば、Asano and Iwata, 2016；気象庁，2016）。そのため、地震の際に実際に活動しうる断層面の下端は、推定された断層面の下端に対して5 km程度深くなる可能性があることに留意されたい（地震調査研究推進本部地震調査委員会長期評価部会，2026）。

注6：評価時点は全て2026年1月1日現在。「ほぼ0%」は0.001%未満の確率値を示す。なお、計算に当たって用いた平均活動間隔の信頼度は低い（△）ことに留意されたい。活断層における今後30年以内の地震発生確率が3%以上を「Sランク」、0.1%～3%を「Aランク」、0.1%未満を「Zランク」、不明（すぐに地震が起きることが否定できない）を「Xランク」と表記している。地震後経過率（注8）が0.7以上である活断層については、ランクに「\*」を付記している。

注7：地震発生確率等の評価の信頼度に関する各ランクの分類条件の詳細は以下のとおりである。

| ランク | 分類条件の詳細                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a   | 発生確率を求める際に用いる平均活動間隔及び最新活動時期の信頼度がいずれも比較的高く（◎又は○）、これらにより求められた発生確率等の値は信頼性が高い。                                                                                |
| b   | 平均活動間隔及び最新活動時期のうち、いずれか一方の信頼度が低く（△）、これらにより求められた発生確率等の値は信頼性が中程度。                                                                                            |
| c   | 平均活動間隔及び最新活動時期の信頼度がいずれも低く（△）、これらにより求められた発生確率等の値は信頼性がやや低い。                                                                                                 |
| d   | 平均活動間隔及び最新活動時期のいずれか一方又は両方の信頼度が非常に低く（▲）、発生確率等の値は信頼性が低い。このため、今後の新しい知見により値が大きく変わる可能性が高い。又は、データの不足により最新活動時期が十分特定できていないために、現在の確率値を求めることができず、単に長期間の平均値を確率としている。 |

注8：最新活動（地震発生）時期から評価時点までの経過時間を、平均活動間隔で割った値。最新の地震発生時期から評価時点までの経過時間が、平均活動間隔に達すると1.0となる。今回の評価の数字のうち例えば山崎断層帯主部（北西部区間）の0.5は1,158年（2026年－868年）を2,200年で割った値であり、0.7は1,158年を1,700年で割った値である。

注9：前回の地震発生から評価時点までの間に地震が発生しているはずの確率。

注10：松田（1975）による経験式（ $\log L = 0.6M - 2.9$ ）より推定。ただし、長さ20 km未満の活断層には適用できない可能性があるため、ここでは信頼度を▲とした。

注11：「津山北方の断層」については、活断層研究会編（1991）では単に「津山北方」としか記載がないことから、本評価に際しては便宜上この断層を「津山北方の断層」と、名称の後ろに「の断層」を付加して表記した。

注12：那岐山断層帯では、最新活動時期が特定できていないため、通常の活断層評価で用いている更新過程（地震の発生確率が時間とともに変動するモデル）により地震発生の長期確率を求めることができない。地震調査研究推進本部地震調査委員会（2001）は、このような更新過程が適用できない場合には、特殊な更新過程であるポアソン過程（地震の発生時期に規則性を考えないモデル）を適用せざるを得ないとしていることから、ここでは、ポアソン過程を適用して那岐山断層帯の将来の地震発生確率を求めた。しかし、ポアソン過程を用いた場合、地震発生の確率はいつの時点でも同じ値となり、本来時間とともに変化する確率の「平均的なもの」になっていることに注意する必要がある。なお、グループ分けは、通常の手法を用いた場合の全国の主な活断層のグループ分け（注1 参照）と同じしきい値（推定値）を使用して行った。

## (説明)

### 1. 山崎断層帯・那岐山断層帯に関するこれまでの主な調査研究

山崎断層帯は、岡山県東部から兵庫県南東部にかけて分布する活断層帯である。山崎断層帯は、山崎断層帯主部と草谷断層の2つの起震断層に区分される。那岐山断層帯は、岡山県東部に分布する活断層帯であり、その東端は山崎断層帯主部に近接する。

松田・岡田(1968)やHuzita(1969)などは、山崎断層帯主部が左横ずれの活断層であることを指摘した。その後、安藤(1972)や福井(1981)により、河谷の屈曲量の計測など、山崎断層帯主部周辺の変位地形が詳しく調査され、地域別に命名・区分が行われた。

山崎断層帯・那岐山断層帯とそれら付近の活断層の位置は、活断層研究会編(1991)、岡山県(1996)、兵庫県(1996, 1999, 2000, 2001)、岡田・東郷編(2000)、千田ほか(2002)、岡田ほか(2002, 2016)、中田・今泉編(2002)、廣内ほか(2015)、松多ほか(2015)、及び今泉ほか編(2018)などに示されている。

岡田ほか(1987)は安富断層において、遠田ほか(1995)及び岡山県(1996)は大原断層において、兵庫県(1996, 1999, 2000, 2001)は土万(ひじま)断層、安富断層、暮坂峠(くれさかとうげ)断層、琵琶甲断層、三木断層及び草谷(くさだに)断層において、加藤ほか(2007)は暮坂峠断層において、産業技術総合研究所(2008)及び吉岡ほか(2008)は琵琶甲断層及び三木断層において、トレンチ調査などの活動履歴に関する調査を行った。

このほか、尾池・岸本(1976)をはじめとして微小地震観測及び地殻変動観測その他の数多くの研究論文が、山崎断層研究グループに属する研究者から発表されている。

### 2. 山崎断層帯・那岐山断層帯の評価結果

山崎断層帯は、岡山県東部から兵庫県南東部に分布する断層帯で、山崎断層帯主部、草谷断層の2つの起震断層で構成される断層帯である(図1、図2)。

山崎断層帯主部は、岡山県勝田郡奈義町から兵庫県三木市に至る西北西―東南東方向に延びる断層帯であり、長さ約85 kmの可能性がある。後述するように、山崎断層帯主部を構成する断層のうち、大原断層、土万断層、安富断層及び暮坂峠断層までの北西部区間と、琵琶甲断層及び三木断層の南東部区間とは、最新活動時期をはじめとした活動履歴が異なるため、評価区分を分けることとする。

大原断層から暮坂峠断層までの各断層の位置は、各資料でほぼ一致している。一方、土万断層の一部、琵琶甲断層及び三木断層の位置は、資料によりやや異なる。

草谷断層は、山崎断層帯主部の南東端付近において東北東―西南西方向に延びる断層である。草谷断層は、山崎断層帯主部とは走向及びずれの向きが異なることから、松田(1990)の定義によれば別の起震断層になる。草谷断層は長さが約13 kmの可能性がある、単独では地震調査研究推進本部(1997)の基盤的調査観測対象である地表の長さ20 km以上の主要活断層帯として評価の対象とはならないが、山崎断層帯主部の南東端に位置する三木断層と非常に近接している上に、兵庫県(2000, 2001)により詳細な調査がなされており、また山崎断層帯主部とはずれの向きが共役的であるので評価対象に含めた。

那岐山断層帯は、岡山県東部に分布する断層帯である。長さは約29 kmの可能性がある、ほぼ東西方向に延びており、断層帯の北側が南側に対して相対的に隆起する断層帯である(表5)。

那岐山断層帯を構成する津山北方の断層、那岐山断層の位置は、資料によりやや異なる。

那岐山断層帯と山崎断層帯主部との距離は5 kmを僅かに下回ることから、これまで山崎断層帯の一部として長期評価が実施されてきた(地震調査研究推進本部地震調査委員会, 2013)。しかし、地震調査研究推進本部地震調査委員会(2013)でも、後述のように、両者の断層帯は走向が異なることに加え、変位の向きも異なり、さらに活動間隔も異なることから、別の起震断層と考えられてきた。ここでは、これらの事実を踏まえ、那岐山断層帯を山崎断層帯と別個の断層帯として評価を行った。

#### 2.1 山崎断層帯主部

##### 2.1.1 山崎断層帯主部の位置・形態

##### (1) 山崎断層帯主部を構成する断層

山崎断層帯主部は、岡山県勝田郡奈義町から兵庫県三木市に至る断層帯で、全体として西北西

一東南東方向に延びている。山崎断層帯主部は、後述するように、最新活動時期の違いから大原断層、土万断層、安富断層及び暮坂峠断層までの北西部区間と、琵琶甲断層及び三木断層の南東部区間に区分される。

大原断層とその南東側の土万断層は1－2 km程度の間隔で雁行・並走する。土万断層よりも南東では、断層帯は安富断層、暮坂峠断層の二つに分岐する。安富断層は、土万断層の延長方向から走向を僅かに東向きに変えて東南東に延び、また、暮坂峠断層は土万断層のほぼ延長方向に延びている。琵琶甲断層は、安富断層の南東延長上に位置するが、地表のトレースは断片的である。三木断層は、更にその南東延長上に位置する。

本断層帯は、活断層研究会編（1991）及び岡田・東郷編（2000）では、断層の分布位置や長さなどから安富断層と琵琶甲断層を境に起震断層が区分されたと考えられていたが、その後、中田・今泉編（2002）により、両者の間隔が5 kmを大きく下回ることが示されたため、起震断層をこの位置では区分しないこととした。ただし、後述するように、この位置を境として最新活動時期をはじめとした過去の活動履歴が異なるため、活動区間を分けている。

また、後述するように、北西部区間を構成する断層のうち、暮坂峠断層については、最新活動時期における変位量が小さいことから、トレンチ調査で認められた過去の活動は最大規模の活動ではなかった可能性もある。

## （2）断層帯の位置・形状

山崎断層帯主部の一般走向は、断層帯の両端を端点に持つ線分と考えると、北西部区間がおおむねN56° W、南東部区間はN50° Wで、全体ではN59° Wとなる。断層帯の長さは、北西部区間、南東部区間でそれぞれ約57 km、約31 kmの可能性があり、断層帯全体の長さは約85 kmの可能性がある。

断層面の上端の深さは、断層面が地表に現れている部分が各所にあることから0 kmと考えられる。

断層面の傾斜は、反射法探査、ボーリング等の調査結果や、断層露頭における観察結果等から、北西部区間・南東部区間ともほぼ垂直である。

断層面の幅は、後述するように、地震発生層の下限の深さが約18 kmと推定されること及び地下深部における断層面の傾斜が地表付近と同様であるとすれば、断層面が高角あるいはほぼ垂直であることから、各区間とも約18 kmの可能性はある。

## （3）断層の変位の向き（ずれの向き）（注13）

山崎断層帯主部は、断層変位地形から判断すると、北東側隆起の上下成分を伴う左横ずれ断層と考えられる。

### 2. 1. 2 山崎断層帯主部の過去の活動

#### （1）平均変位速度（平均的なずれの速度）（注13）

##### （北西部区間）

##### 大原断層西町地点（横ずれ成分）（図2の地点2）

岡山県（1996）は、大原断層西町地点におけるトレンチ調査で砂礫層の基底面に左横ずれ変位が認められること及び条痕が全て水平であることに着目し、砂礫層の基底面の断層平行方向の傾斜角（約7.5°）と見かけの上下変位（約3.9m）から、横ずれ変位量を約30mと算出した。この砂礫層は、約3万年前と推定されることから、この地点における平均変位速度（横ずれ成分）は約1 m／千年であった可能性がある。

##### 大原断層中町地点（横ずれ成分）

岡山県（1996）は、大原断層中町地点において、LⅡ面が削った段丘崖に30mの左横ずれ変位が見られるとしている。この近傍においてLⅡ面構成層に始良Tn火山灰（Smith *et al.*, 2013；約3万年前、注14）が挟まれることから、LⅡ面の形成時期を約3万年前と考えると、この地点における平均変位速度（横ずれ成分）は、1.0m／千年程度であった可能性がある。

##### 安富断層安志地点（上下成分）（図2の地点4）

兵庫県（1996）は、安富断層安志地点におけるトレンチ調査及び近傍で行ったボーリング調査



の結果から、D2層（礫混じり腐植質シルト、 $^{14}\text{C}$ 年代値から約1万6千年－1万4千年前、注15）の上下変位量を1.2－1.5m、また、始良Tn火山灰層（約3万年前）の上下変位量を2.0－2.2mとしている。これから、この地点の平均変位速度（上下成分）は、最大0.1m／千年程度であった可能性がある。

#### （南東部区間）

##### 琵琶甲断層青野ヶ原地点（横ずれ成分、上下成分）

活断層研究会編（1991）及び兵庫県（1999）は、琵琶甲断層青野ヶ原地点において、高位段丘面を刻む谷に屈曲があることに着目した。活断層研究会編（1991）は谷の屈曲量を80－120m、段丘面の年代を約15万年前としている。また、兵庫県（1999）は谷の屈曲量を50－150m、段丘面の年代を約20万年前としている。屈曲量には幅があるが、谷の形成は段丘面の形成より後であることを考慮すると、平均変位速度（横ずれ成分）は0.8m／千年程度であった可能性がある。

また、活断層研究会編（1991）、兵庫県（1999）及び岡田・東郷編（2000）は、同地点付近において高位段丘面に5－15mの上下変位を認めている。これから、この地点における平均変位速度（上下成分）は、0.03－0.1m／千年であった可能性がある。

これらの評価を総合すると、山崎断層帯主部の平均変位速度は、北西部区間においては、左横ずれ成分が約1m／千年と推定され、上下成分が最大0.1m／千年程度以下であった可能性がある。また、南東部区間においては左横ずれ成分が0.8m／千年程度、上下成分が0.03－0.1m／千年程度であった可能性がある。

#### （2）過去の活動時期

##### a) 地形・地質的に認められた過去の活動

##### （北西部区間）

##### 大原断層古町地点（図2の地点1）

遠田ほか（1995）は、古町地点におけるトレンチ調査において、北側壁面のスケッチからMS2層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から7－8世紀）を切る断層（F3）の存在と、南側壁面のスケッチからこの断層がMS1層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から17世紀以降）に覆われていることを指摘した。これから、最新活動は7世紀以後にあったと推定される。

また、遠田ほか（1995）は、このF3断層付近でS2層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から約3千4百－3千2百年前）が撓曲していること及びその上位のG2層は変形していないことを指摘した。G2層の年代は明らかではないが、その上位のS1層からは $^{14}\text{C}$ 年代値から6－7世紀という年代が得られていることから、1つ前の活動は約3千4百年前以後、7世紀以前にあった可能性がある（図3）。

このほか、同トレンチではG3層堆積以後S2層堆積以前、G4層堆積以後G3層堆積以前にも活動があった可能性があるが、これらの地層の年代は明らかにされていない。

##### 大原断層西町地点（図2の地点2）

岡山県（1996）は、西町地点におけるトレンチ調査において、南側壁面のスケッチより、断層面がG3層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から9世紀－12世紀）の下部までを変位させている可能性があるとして指摘した（図4）。断層変位を受けていないM2層からは12－13世紀の $^{14}\text{C}$ 年代値が得られている。断層の変位を受けているG3層下部からは9－11世紀の $^{14}\text{C}$ 年代値が得られていることから、最新活動は9世紀以後、13世紀以前にあったと推定される。

また、岡山県（1996）は、G3層の下位のG2層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から約5千7百年前－6世紀）が複雑に変形しており、礫の再配列も見られることからG2層堆積中にも活動があった可能性を指摘した。しかし、この変形が最新の活動で生じた可能性が否定できないこと、またトレンチから採取された同層中の試料は、その年代値にばらつきがあるため、1回前の活動の信頼性は低い。

##### 土万断層青木地点（図2の地点3）

兵庫県（1996）は、青木地点においてトレンチ調査を行ったが、壁面からは明瞭な断層面は検出されなかった。その後、兵庫県（2001）は、兵庫県（1996）の調査結果について再検討を行い、南東側壁面のB層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から約5千7百－5千4百年前～3千5百－3千3百年前）に含まれる材（ $^{14}\text{C}$ 年代値から約4千1百－3千7百年前）が周辺の腐植土とともに流動したような変形構

造が認められるとして、この時期以後に土万断層が活動した可能性を指摘したが、これが最新活動に該当するかどうかは不明である。

#### 安富断層安志地点（図2の地点4）

岡田ほか（1987）は、安志A地点におけるトレンチ調査において、A6層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から1－4世紀）以下の地層が撓み、A4層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から14－17世紀）に覆われていることから、1世紀以後、17世紀以前に最新活動があったと指摘した。また、約6千7百年前以降の地層が断層により引きずり上げられているのに対してA6層はほぼ水平であることから、これが別の活動であった可能性を指摘した。しかし、この活動については直接的な証拠はない。

また、岡田ほか（1987）は、安志C地点におけるトレンチ調査において、CF1断層がC4層を変位させ、C2層に覆われていることから、C4層堆積以後C2層堆積以前に最新活動があったものと推定した。このC4層からは、 $^{14}\text{C}$ 年代値から8－10世紀の年代と7世紀末から8世紀にかけて使用された土器片が、また、C2層からは $^{14}\text{C}$ 年代値から12－14世紀の年代と12世紀の須恵器片が、それぞれ得られている。

さらに、兵庫県（2001）は、兵庫県（1996）が上記地点のすぐ東側で行ったトレンチ調査の結果を再解釈し、F-1断層が $^{14}\text{C}$ 年代値が約2千4百年前－5世紀の地層を切断して $^{14}\text{C}$ 年代値が13－14世紀の地層に覆われること、F-2断層が $^{14}\text{C}$ 年代値が約3千2百－2千9百年前の地層を切断して $^{14}\text{C}$ 年代値が約2千8百－2千6百年前の地層に覆われること、さらに、 $^{14}\text{C}$ 年代値が約1万－8千3百年前の地層の変形を $^{14}\text{C}$ 年代値が約3千2百－2千9百年前の地層が水平に覆っていることなどから、これらがそれぞれ最新、1回前、2回前の活動であるとした。しかし、兵庫県（1996）のスケッチ（図5）によれば、最新活動については、断層で切られていると確認できるのは $^{14}\text{C}$ 年代値で約3－4世紀を示す地層である。また、1回前とされる活動については、F-2断層が上方でせん滅するように示され、必ずしも上位の地層に覆われるとは言えないことから、この活動を最新活動と区別することはできない。さらに、2回前とされる活動については、変形した地層から約9千1百－8千9百年前の $^{14}\text{C}$ 年代が得られていることから、この地点での最新活動は3世紀以後、14世紀以前、1回前の活動は約9千1百年前以後、約2千9百年前以前にあったと推定される。

このほか、兵庫県（1996, 2001）は、この地点のトレンチ調査から、更に古い時期の活動についても言及しているが、これらについては年代を特定することが困難である。

これらの結果を総合して、この地点においては8世紀以後、14世紀以前に最新活動があったと推定され、約9千1百年前以後、約2千9百年前以前に1つ前の活動があったと推定される。

#### 暮坂峠断層川戸地点（図2の地点5）

兵庫県（2001）は、川戸地点でトレンチ調査を行った。この地点では幾つかの小断層が見られる。その1つが、B2層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から6－7世紀）の基底を変位させ、A層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から11－13世紀）に覆われているとしている。これらの小断層については、変位量が小さいことから、最大規模の活動ではなく安富断層の活動に伴う副次的な活動であった疑いがあるが、ここでは、この地点では6世紀以後、13世紀以前に最新活動があった可能性があるものとする。

#### 暮坂峠断層奥護持地点（図2の地点6）

加藤ほか（2007）は、奥護持地点におけるトレンチ調査において、三瓶浮布火山灰（SUK: Smith *et al.*, 2013; 約2万年前、注16）に由来する火山ガラスを含む地層に変位を与え、鬼界アカホヤ火山灰（K-Ah: Smith *et al.*, 2013; 約7千2百年前、注17）起源の火山ガラスを含む地層に覆われる断層を確認し、約2万年前から約7千2百年前までの間に断層活動があったとした。また、断層による地層の変位量が20－30 cmと小さいことから、トレンチに見られる断層活動は1回であるとした。なお、加藤ほか（2007）は、本トレンチの結果と護持地点の断層露頭で認められた最新活動（約7千2百年前以後：後述）から、暮坂峠断層は約2万年前以後に少なくとも2回活動しており、その平均活動間隔は最長で1万年程度としている。しかしながら、本トレンチにおいて、護持地点で認められた最新活動は認められていないことから、本トレンチで暮坂峠断層の全ての活動が記録されているわけではない可能性がある。したがって、ここでは加藤ほか（2007）により示された平均活動間隔は参考扱いとする。

#### 暮坂峠断層護持地点（図2の地点7）

兵庫県（2000）は、護持地点におけるトレンチ調査において、何本も存在する小断層の1つがB2層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から7－8世紀以後）を切断していると指摘した。

この小断層においても川戸地点と同様に最大規模の活動ではなかった疑いがあるが、7世紀以後に最新活動があった可能性があるものとする。

兵庫県（2000）のトレンチ地点に近接する断層露頭（岡田・東郷編，2000）を精査した加藤ほか（2007）は、断層変位を受けた堆積物中にK-Ahに由来する火山ガラスを認め、暮坂峠断層の最新活動が約7千2百年前以後であるとした。

### （南東部区間）

#### 琵琶甲断層琵琶甲地点（図2の地点8）

兵庫県（2001）は、琵琶甲地点において兵庫県（2000）が行ったトレンチ調査（図6）及びボーリング調査等の結果を再解釈し、最新活動により断層ⅡがG層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から約4千3百－4千1百年前～約2千4百－2千2百年前）を切断してF層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から5－6世紀）に覆われていると指摘した。本評価では、最新活動時期として、G層のうち断層Ⅱの変位を受けていることが確実な部分から採取された試料の $^{14}\text{C}$ 年代（約3千6百－3千5百年前）に基づき、約3千6百年前以後、6世紀以前と推定した。また、兵庫県（2001）は、最新活動に先立つ活動により断層ⅠがH層を切断してG層に覆われていると指摘している。G層から得られた最も古い $^{14}\text{C}$ 年代から、その時期は約4千1百年前以前と推定される。しかし、H層は約1万年前以後の沖積層であるとししか分かっていないため、活動時期を十分絞り込むことはできないと判断した。これより、このトレンチでは、約3千6百年前以後、6世紀以前に最新活動があったと推定される。

産業技術総合研究所（2008）及び吉岡ほか（2008）は、兵庫県（2000）で確認された断層の延長上で、新期の地層がより厚く堆積していると推定される地点を選定し、トレンチを掘削した（図7）。トレンチ壁面には、大阪層群の砂礫層（D層）とそれを覆う礫層・腐植質土層（C、B層：C層はC2層とC1層に細分）が露出し、それらの一部を切る複数の明瞭な断層が確認された（図8）。そのうちD層よりも上位の地層を明瞭に変位させるF1断層は、トレンチ北西壁面ではV字状の断層帯を呈し、その間にC2層が引きずり込まれるように分布している。一方、F1断層はC1層にほぼ水平に覆われている。このことから、最新活動はC2層堆積後、C1層堆積前であったと推定される。断層変位を受けたC2層から採取された試料のうち、最も若い $^{14}\text{C}$ 年代を示す試料（試料BW-22）は5－6世紀の年代を示す。一方、断層変位を受けていないC1層から採取された強腐植質土（試料BW-4）は3－5世紀の $^{14}\text{C}$ 年代を示し、C2層の年代よりも古い。産業技術総合研究所（2008）及び吉岡ほか（2008）は、C2層中の試料BW-22は長辺5mm程度の炭質物片であり、年代値の若返りは考えにくいとしている。このことから、C1層中から採取された3－5世紀を示す年代試料は二次堆積によるものである可能性が高いと考えられる。C1層を覆うB層中から採取された有機質堆積物は11－12世紀の $^{14}\text{C}$ 年代を示し、層序と年代に矛盾は見られない。これより、このトレンチでは、5世紀以後、12世紀以前に最新活動があったと推定される。

これらの結果を総合すると、琵琶甲地点における最新活動の時期は5世紀以後、6世紀以前であったと推定される。

#### 三木断層大島地点（図2の地点9）

兵庫県（2000，2001）は、大島地点においてトレンチ調査及びボーリング調査等を行い、断層位置の推定と活動時期の特定を試みた。このうちトレンチ調査の結果より、C層以後の地層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から3－4世紀以後）が水平に堆積しているのに対し、D層以前の地層（ $^{14}\text{C}$ 年代値から約2千8百－2千4百年前以前）に擾乱が見られることから、約2千4百年前に最新活動があったと指摘している。ただし、このトレンチ調査からは明瞭な断層が見つかっておらず、断層の可能性のある地層の擾乱が見られるだけである。

これより、この地点では、最新活動時期に関する評価は行わないこととする。

以上の各地点における過去の活動時期を総合すると、断層帯主部北西部区間では、9世紀以後、13世紀以前に最新活動があったと推定され、約3千4百年前以後、約2千9百年前以前に1回前の活動があった可能性がある。

また、断層帯主部南東部区間については、琵琶甲断層の活動履歴から、5世紀以後、6世紀以前に最新活動があったと推定される（図9）。

## b) 先史時代・歴史時代の活動

岡田・安藤(1979)、遠田ほか(1995)は、大原断層から安富断層にかけての断層帯が868年の地震(マグニチュード(M) 7.0以上)を発生させた可能性を指摘している。

また、宇佐美ほか(2013)では868年の地震の震央は姫路付近としており、山崎断層の活動によるとも指摘している。

これらは地形・地質的に認められた断層帯主部北西部区間の最新活動時期とはおおむね調和する。

これらを総合して、大原断層から安富断層、暮坂峠断層にかけての北西部区間は、868年の地震を発生させたと推定される。

### (3) 1回の変位量(ずれの量) (注13)

#### (北西部区間)

岡山県(1996)は、大原断層西町地点でトレンチ調査を実施した際に、底面に現れた砂層と礫層の食い違い量から、1.6mの左横ずれ量を検出し、引きずりなどを考慮すると約2mが妥当とした。

また、兵庫県(2001)は、安富断層安志地点でトレンチ調査を実施した際に、B層基底面が断層活動を受けて上下変位を起こしていることに着目し、これを1回の活動によるものと見て、上下方向の変位量を0.2mとした。

一方、北西部区間の長さである約57 kmを経験式(1)に適用して得られる1回の活動に伴う変位量は約5.7mとなる。

用いた経験式は、松田ほか(1980)による次の式である。ここで、Lは1回の地震で活動する断層の長さ(km)、Dは1回の活動に伴う変位量(m)である。

$$D = 10^{-1} L \quad (1)$$

これらのことから、北西部区間の1回の活動に伴う左横ずれ変位量は2－6m程度であった可能性がある。

なお、トレンチから復元された北西部区間における1回の変位量(約2m)は、平均変位速度(約1m/千年)及び後述する平均活動間隔(1千7百－2千2百年程度)から得られる値(約1.7－2.1m)とは調和的である。一方、こうした値は、北西部区間の長さ(約57 kmの可能性ある)を経験式(1)に当てはめて得られる値である約5.7mよりは有意に小さい。このことは、北西部区間の全長約57 kmが1つの活動区間ではなく、複数の活動区間からなる可能性があることを示している。一方、北西部区間を構成する各断層でのトレンチ調査の結果、最新活動はいずれも868年の地震に対比されることから、全長が1つの活動区間であり、トレンチで確認された変位量は、最新活動時の代表的な値ではない可能性もある。

#### (南東部区間)

南東部区間においては、1回の活動に伴う変位量に関する直接的な資料は得られていないが、南東部区間の長さである約31 km及び経験式(1)から1回の活動に伴う変位量が約3.1mと計算されることから、1回の活動に伴う変位量は3m程度であった可能性がある。

### (4) 活動間隔

#### (北西部区間)

大原断層から安富断層及び暮坂峠断層までの北西部区間については、各断層の過去の活動履歴を考慮すると、最新活動時期が868年の地震、1つ前の活動が約3千4百年前以後、約2千9百年前以前であるから、平均活動間隔は1千7百－2千2百年程度であった可能性がある。

#### (南東部区間)

琵琶甲断層及び三木断層からなる南東部区間については、最新活動時期が5世紀以後、6世紀以前、1つ前の活動が約4千1百年前以前であることから、平均活動間隔は約2千5百年以上であった可能性がある(図9)。一方、平均変位速度(横ずれ成分)0.8m/千年及び断層帯の長さ(約31 kmの可能性ある)から経験式(1)を用いて求めた1回の変位量約3.1mより、平均活動間

隔は3千9百年程度であった可能性がある。ここでは、最新活動の1つ前の活動を十分絞り込むことができていないことを考慮して、平均活動間隔は、平均変位速度と1回の変位量に基づく3千9百年程度であった可能性があると評価した。

## (5)活動区間

大原断層から安富断層、暮坂峠断層までの北西部区間の最新活動時期が少なくとも9世紀以後で、具体的には868年の地震であったと推定される。一方、琵琶甲断層に代表されるように南東部区間の最新活動時期が6世紀以前であった可能性がある。以上のことから、少なくとも最新活動時期からは、活動区間が北西部区間及び南東部区間に分けられる。

## (6)測地観測結果

山崎断層帯周辺における、最近5年間及び2012年からの10年間のGNSS観測結果では、北西－南東方向の僅かな縮みが見られる(図10－1、図10－2)。1994年までの約100年間の測地観測結果では、東西方向ないし北東－南西方向の僅かな縮みが見られる(図10－3)。

## (7)地震観測結果

2022年12月までの20年間の地震観測結果によれば、山崎断層帯主部周辺では、断層帯に沿って、定常的に地震活動が見られ、M3.0以上の地震がたびたび発生している(図11－1)。本断層帯周辺における地震発生層の下限の深さは18 km程度である(図12－1、図12－2)。発震機構は、西北西－東南東方向や東北東－西南西方向に圧力軸を持つ型が多い(図11－4)。1919年以降、本断層帯周辺ではM5.0以上の地震が9回発生している。

## 2. 1. 3 山崎断層帯主部の将来の活動

### (1)活動区間と活動時の地震の規模

大原断層から安富断層・暮坂峠断層までの北西部区間のみが活動した場合、経験式(2)からM7.8程度の地震が発生し、その際に断層近傍では過去の活動履歴及び経験式(1)から2－6 m程度の左横ずれが生じる可能性がある。

琵琶甲断層及び三木断層からなる南東部区間のみが活動した場合、経験式(2)からM7.3程度の地震が発生し、その際に経験式(1)から断層近傍で3 m程度の左横ずれが生じる可能性がある。

山崎断層帯主部全体が同時に活動する可能性もあり、その場合、全長が約85 kmの可能性があることから、経験式(2)に基づきM8.0程度の地震が発生する可能性がある。

用いた経験式は松田(1975)による次の式である。ここで、Lは1回の地震で活動する断層の長さ(km)、Mはその時のマグニチュードである。

$$\log L = 0.6M - 2.9 \quad (2)$$

### (2)地震発生の可能性

山崎断層帯主部における将来の地震発生確率は、表2のとおりである。

平均活動間隔が十分絞り込まれていないため、地震発生確率にも幅があるが、最も高い値に着目すると、本断層帯北西部区間は今後30年の間に地震が発生する可能性が我が国の主な活断層の中ではやや高いグループに属することになる。

断層帯全体が同時に活動する場合の地震発生確率は、北西部区間及び南東部区間で個々に地震が発生する場合の確率を超えないと考えられる。

## 2. 2 草谷断層

### 2. 2. 1 草谷断層の位置・形態

#### (1)草谷断層を構成する断層

草谷断層は、兵庫県三木市から兵庫県加古川市に至る断層で、兵庫県(1999)により確認された断層である(図1、図2)。

草谷断層は、全体として東北東－西南西方向に延びており、全長は約13 kmの可能性がある。草谷断層は長さが20 km未満であることから単独では地震調査研究推進本部(1997)の基盤的調査観測対象である地表の長さ20 km以上の主要活断層帯としての評価の対象とはならないが、山崎断層帯主部の南東端に位置する三木断層と非常に近接している上に、兵庫県(2000, 2001)により詳

細な調査がなされており、さらにずれの向きが山崎断層帯主部と共役であることから、山崎断層帯の評価対象に含めることとした。

## (2)断層の位置・形状

草谷断層の一般走向は、断層の両端を端点に持つ線分と考えると、N59° Eとなる。

断層面上端の深さは、断層面が地表に現れている部分が各所にあることから、0 kmと考えられる。

断層面の傾斜は、地表のトレースがほぼ直線状であること等の断層変位地形から、ほぼ垂直と推定される。

断層面の幅は、後述するように、地震発生層の下限の深さが13 km程度であること及び地下深部における断層面の傾斜が地表付近と同様であるとすれば、断層面がほぼ垂直と推定されることから、13 km程度である可能性がある。

## (3)断層の変位の向き(ずれの向き) (注13)

草谷断層は、断層変位地形から判断すると、北西側隆起の上下成分を持つ右横ずれ断層と考えられる。

### 2. 2. 2 草谷断層の過去の活動

#### (1)平均変位速度(平均的なずれの速度) (注13)

兵庫県(1999)は、加古郡稲美町草谷付近の高位段丘Ⅱ面に5 mの上下変位を検出し、条線の方  
向から約40mの横ずれ変位があるものと推定した。また、兵庫県(2001)は、三木市福井付近の  
高位段丘面を刻む谷に約30mの屈曲を認めている。

高位段丘面の形成時期を約20万年前と考えると、この地点における平均変位速度(右横ずれ成  
分)は、約0.2m/千年であった可能性がある。

#### (2)過去の活動時期

##### a)地形・地質的に認められた過去の活動

兵庫県(2000, 2001)は、草谷地点でトレンチ調査を行い、南西側壁面で断層が、<sup>14</sup>C年代値(注  
15)が5-6世紀である地層を切り、<sup>14</sup>C年代値が10-12世紀である地層に覆われていると指摘し  
た(図13)(図2の地点10)。

また、兵庫県(2000, 2001)は、同地点の北東側壁面で、別の断層が固結度から沖積層であると  
推定される地層の下部を切り、この地層の上部に覆われていると指摘しているが、この地層の年  
代は不明である。

これより、この地点では5世紀以後、12世紀以前に最新活動があったと推定される。

##### b)先史時代・歴史時代の活動

この地域における5世紀以後12世紀以前の顕著な歴史地震は、山崎断層帯主部北西部区間の最  
新活動である868年の地震が代表的であるが、それよりも古い時期に記録に残らない地震が発生し  
ていた可能性も考えられるため、868年の地震が草谷断層の活動に対応しているかどうかは不明で  
ある。

#### (3)1回の変位量(ずれの量) (注13)

草谷断層では、1回の活動に伴う変位量に関する直接的な資料は得られていないが、断層の長  
さである約13 km及び経験式(1)から1回の活動に伴う変位量は約1.3mと計算されることから、1  
回の活動に伴う右横ずれ変位量としては1 m程度であった可能性がある。

#### (4)活動間隔

兵庫県(2000, 2001)が草谷地点で行ったトレンチ調査において、北東側壁面の断層を1回前の  
活動だと考えると、この断層が下部を切っている地層が沖積層であると推定されることから、平  
均活動間隔は数千年程度であった可能性がある。

なお、平均変位速度(約0.2m/千年)と1回の変位量(約1.3m、経験式(1)を使用)からは、  
平均活動間隔として約6千5百年という値が得られる。以上のことから、平均活動間隔は6千5

百年程度の可能性がある。

#### (5)活動区間

草谷断層は、断層全体で1区間をなして活動したと推定される。

なお、兵庫県（2001）は、本断層が琵琶甲断層、三木断層と同時に活動した可能性を指摘している。

#### (6)測地観測結果

草谷断層周辺における、最近5年間及び2012年からの10年間のGNSS観測結果では、西北西－東南東方向の縮みが見られる（図10－1、図10－2）。1994年までの約100年間の測地観測結果では、東西方向の僅かな縮みと南北方向の僅かな伸びが見られる（図10－3）。

#### (7)地震観測結果

2022年12月までの20年間の地震観測結果によれば、草谷断層周辺では、山崎断層帯主部よりも地震発生数は少ないものの、小規模な地震が観測されている（図11－2）。本断層周辺における地震発生層の下限の深さは13 km程度である（図12－3）。発震機構が求まる地震は極めて少ないが、東西方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型が見られる（図11－4）。1919年以降、本断層周辺でM5.0以上の地震は発生していない。

### 2.2.3 草谷断層の将来の活動

#### (1)活動区間と活動時の地震の規模

断層全体が同時に活動するとして、断層の全長が約13 kmの可能性があることから、経験式(2)からM6.7程度の地震が発生する可能性がある（注10）。また、その際に経験式(1)から断層近傍では1 m程度の右横ずれが生じる可能性がある。

#### (2)地震発生の可能性

草谷断層の将来の地震発生確率は、表4に示すとおりである。

### 2.3 那岐山断層帯

#### 2.3.1 那岐山断層帯の位置・形態

##### (1)那岐山断層帯を構成する断層

那岐山断層帯は、岡山県苫田（とまた）郡鏡野町から岡山県勝田郡奈義（なぎ）町に至る断層帯で、西から津山北方の断層及び那岐山断層で構成される断層帯である（図2）。那岐山断層帯と山崎断層帯主部との距離は5 kmを下回ることから、松田（1990）の基準に則って山崎断層帯の一部として長期評価が実施されてきた（地震調査研究推進本部地震調査委員会，2013）が、後述するように、断層帯の走向が異なることに加え、大原断層以東は左横ずれが主体であるのに対し、那岐山断層以西は北側隆起が主体で右横ずれ成分を伴うなど、ずれの向きも異なるため、両者は別の起震断層と評価した。

##### (2)断層帯の位置・形状

那岐山断層帯の長さは約29 kmの可能性があるが、走向はN84° Eと考えられる。

断層面上端の深さは、断層面が地表に現れている部分が各所にあることから0 kmと考えられる。

那岐山断層帯付近の地震発生層の深さの下限は16 km程度の可能性があるが、断層面の傾斜が不明であるため、断層面の幅は不明である。

##### (3)断層の変位の向き(ずれの向き)（注13）

那岐山断層帯は、断層変位地形から判断すると、北側が南側に対して相対的に隆起する断層と推定される。活断層研究会編（1991）では、津山北方の断層、那岐山断層ともに、北側隆起の断層として記載している。また、岡山県（1996）及び中田・今泉編（2002）では、那岐山断層について、右横ずれ成分の存在を指摘している。

## 2. 3. 2 那岐山断層帯の過去の活動

### (1) 平均変位速度(平均的なずれの速度) (注13)

岡山県(1996)は、奈義町日本原地点においてN2リニアメントに沿ってHⅡ段丘面に20–30m、HⅢ段丘面に20mの低断層崖が認められることを指摘している。岡山県(1996)はHⅡ段丘面の形成時期を35万年前、HⅢ段丘面の形成時期を25万年前と推定していることから、信頼度は余り高いものの、この地点における平均変位速度(上下成分)は約0.06–0.09m/千年であった可能性がある。

### (2) 過去の活動時期

#### a) 地形・地質的に認められた過去の活動

岡山県(1996)は、那岐山断層について、陸上自衛隊日本原演習地内のHⅢ段丘面上をN2リニアメントが通過する地点に断層崖が認められ、崖の末端付近においてローム層の直上に分布する黒ボク土が、断層を挟んで北側が約60 cm隆起するような変位を示していること、また、南側の黒ボク土にはロームの破片が含まれていることから、この露頭は断層活動後に直下のローム層ともども崩壊して形成されたものと指摘した。しかし、露頭では黒ボク土と断層との関係は確認されておらず、この崩壊が断層活動に起因するかどうかとも判断できないことから、この露頭から断層の活動時期を議論することはできない。

なお、活断層研究会編(1991)では、津山北方の断層について、更新世中期以降活動の形跡なしとしているが、その具体的な根拠は示されていない。

#### b) 先史時代・歴史時代の活動

那岐山断層帯付近では、断層帯の活動と関係するような歴史時代の被害地震は知られていない。以上のことから、那岐山断層帯の最新活動時期は不明である。

### (3) 1回の変位量(ずれの量) (注13)

那岐山断層帯では、1回の活動に伴う変位量に関する直接的な資料は得られていないが、断層帯の長さである約29 km及び経験式(1)からは、1回の活動に伴う変位量は約2.9mと計算されることから、1回の活動に伴う変位量としては、3 m程度であった可能性がある。断層面の傾斜が不明なため、傾斜が45度から90度の間にあるものと仮定し、横ずれが無いものとして上下変位量を算出すると約2.1–2.9mとなることから、1回の活動に伴う上下変位量は2–3 m程度の可能性がある。

### (4) 活動間隔

那岐山断層帯では、平均活動間隔に関する信頼性の高いデータは得られていないが、上下方向の平均変位速度である約0.06–0.09m/千年及び断層帯の長さ(約29 kmの可能性はある)から経験式を用いて求めた1回の活動に伴う上下変位量(約2.1–2.9m)から計算すれば、平均活動間隔は2万3千–4万8千年程度であった可能性がある。

### (5) 活動区間

那岐山断層帯の過去の活動区間については、精度の良い資料が得られていないが、松田(1990)の基準から、断層帯全体が1区間をなした可能性がある。

### (6) 測地観測結果

那岐山断層帯周辺における、最近5年間及び2012年からの10年間のGNSS観測結果では、断層帯の西部で北北西–南南東方向の縮みが見られる(図10–1、図10–2)。1994年までの約100年間の測地観測結果では、東西方向ないし北西–南東方向の僅かな縮みが見られる(図10–3)。

### (7) 地震観測結果

2022年12月までの20年間の地震観測結果によれば、那岐山断層帯周辺の地震活動は、山崎断層帯主部や草谷断層帯周辺と比べると低調である(図11–3)。本断層帯付近における地震発生層の下限の深さは16 km程度である(図12–4)。発震機構の求まる地震は極めて少ないが、西北西–東南東方向や東北東–西南西方向に圧力軸を持つ横ずれ断層型が見られる(図11–4)。1919年



以降、本断層帯周辺ではM5.0以上の地震は発生していない。

### 2.3.3 那岐山断層帯の将来の活動

#### (1) 活動区間と活動時の地震の規模

那岐山断層帯全体が1区間として活動した場合、経験式(2)からM7.3程度の地震が発生し、その際には断層帯の北側が南側に対して2-3m程度高まる段差が生ずる可能性がある。

#### (2) 地震発生の可能性

那岐山断層帯の平均活動間隔は、直接的なデータではないが、2万3千-4万8千年程度の可能性がある。しかし、最新活動時期が特定できていないために、上記のようなM7.3程度の地震が発生する長期確率を更新過程（地震の発生確率が時間とともに変動するモデル）を用いて評価することができない（表6）。

地震調査研究推進本部地震調査委員会（2001）は、地震の発生確率を求めるに当たって、通常の活断層評価で用いている更新過程が適用できない場合には、特殊な更新過程であるポアソン過程（地震の発生時期に規則性を考えないモデル）を適用せざるを得ないとしている。信頼度の低い平均活動間隔を用いた計算であることに十分留意する必要があるが、ポアソン過程を適用して地震発生確率を求めると表6のとおりとなる。

平均活動間隔の信頼性が低く、また値が十分絞り込まれていないため、地震発生確率にも幅があるが、最も高い値に注目すると、那岐山断層帯は今後30年の間に地震が発生する可能性が我が国の主な活断層の中ではやや高いグループに属することになる。

### 3. 今後に向けて

今回の評価では、従来の評価による山崎断層帯の構成断層であった山崎断層帯主部と那岐山断層帯について、位置形状や活動様式、活動間隔などの違いという観点から評価区分を見直した結果、山崎断層帯と那岐山断層帯を異なる起震断層として取り扱うこととした。しかしながら、山崎断層帯・那岐山断層帯の長期評価について次のような課題が残されている。

山崎断層帯主部では、全体的に平均活動間隔に関する信頼性の高いデータが得られていない。また、本断層帯の南東部区間は、その形状が明瞭ではなく、北西部区間と最新活動時期が異なる上に、三木断層については過去の活動履歴に関する信頼性が低いと考えられる。南東部区間と北西部区間の位置関係及び連動の有無を明らかにする観点並びに、過去の活動履歴の信頼性を向上させる観点から、更なる調査が必要である。北西部区間については全体を1つの活動区間としたが、暮坂峠断層については最新活動に先行すると評価した断層活動（約3千4百年前以後、約2千9百年前以前）の痕跡は認められておらず、別の活動区間である可能性もある。また、断層帯主部の北西部区間における1回の変位量に関しては、トレンチから復元された値は、平均的変位速度と平均活動間隔から求められた値と調和的であるのに対して、断層の長さを経験式に当てはめて得られた値より有意に小さい。このことは、北西部区間の全体が1つの活動区間ではなく、複数の活動区間からなる可能性があることを示している。一方、北西部区間を構成する各断層での最新活動はいずれも868年の地震に対比されることから、全長が1つの活動区間であり、限定的なトレンチ調査で確認された変位量が最新活動時の代表的な値ではない可能性もある。北西部区間における活動区間を明らかにするためには、各断層について最新活動に先行する断層活動の時期やその際の変位量を明らかにする必要がある。

草谷断層では、平均活動間隔の信頼性が低い上に、最新活動時期も十分絞り込まれていないため、これらの信頼性を向上させる観点で更なる調査が必要である。

那岐山断層帯は、過去の活動履歴がほとんど知られていないことから、過去の活動履歴全般について更なる調査が必要である。

注13：本文及び表1、表3、表5では、「変位」を一般に分かりやすいように「ずれ」という言葉で表現している。ここでは専門用語である「変位」が、本文や表の「ずれ」に対応するものであることを示すため、両者を併記した。以下、文章の中では「変位」を用いる。なお、活断層の専門用語では、「変位」は切断を伴う「ずれの成分」と、切断を伴わない「撓（たわ）みの成分」よりなる。

注14：始良Tn火山灰（AT）の降下年代値は、山崎断層帯の従来評価（地震調査研究推進本部地震調査委員会、2013）では約2万8千年前としていたが、ここではSmith *et al.* (2013)に従い、約3万年

前とした。

注15：放射性炭素同位体年代 ( $^{14}\text{C}$ 年代) については、較正曲線IntCal20 (Reimer *et al.*, 2020)を用いたOxCal 4.4 (Bronk Ramsey, 2009, 2021)に基づいて暦年補正し、原則として1 $\sigma$ の数値を示した。このうち2,000年前よりも新しい年代値は世紀単位で示した。2026年1月1日を起点として、2,000年前より古く、10,000年前よりも新しい年代値については、四捨五入して百年単位で、10,000年前よりも古い年代値は四捨五入して千年単位で示した。

注16：三瓶浮布火山灰 (Suk) の降下年代は、山崎断層帯の従来評価 (地震調査研究推進本部地震調査委員会, 2013) では約2万-2万1千年前としていたが、Smith *et al.* (2013)に従い、約2万年前とした。

注17：鬼界アカホヤ火山灰 (K-Ah) の降下年代値は、山崎断層帯の従来評価 (地震調査研究推進本部地震調査委員会, 2013) では約7千3百年前としていたが、ここではSmith *et al.* (2013)に従い、約7千2百年前とした。

## 文 献

安藤喜美子 (1972)：三浦半島・伊豆半島および兵庫県山崎付近における断層の横ずれによる谷の変位量について．地理学評論，**45**，716-725.

Asano, K. and Iwata, T. (2016): Source rupture processes of the foreshock and mainshock in the 2016 Kumamoto earthquake sequence estimated from the kinematic waveform inversion of strong motion data. Earth Planets Space, **68**:147, doi:10.1186/s40623-016-0519-9.

Bronk Ramsey, C. (2009): Bayesian analysis of radiocarbon dates. Radiocarbon, **51**, 337-360.

千田 昇・岡田篤正・中田 高・金田平太郎 (2002)：1:25,000 都市圏活断層図「山崎」．国土地理院技術資料，D1-No. 396.

福井謙三 (1981)：山崎断層系の変位地形．地理学評論，**54**，196-213.

廣内大助・鈴木康弘・中田 高・松多信尚・八木浩司 (2015)：1:25,000都市圏活断層図「高砂」．国土地理院技術資料，D1-No. 730.

Huzita, K. (1969)：Tectonic development of southwest Japan in the Quaternary period. J. Geosci., Osaka City Univ., **12**, 53-70.

兵庫県 (1996)：「平成7年度地震調査研究交付金 山崎断層に関する調査成果報告書」．兵庫県，114p.

兵庫県 (1999)：「平成10年度地震関係基礎調査交付金 山崎断層帯に関する調査成果報告書」．兵庫県，99p.

兵庫県 (2000)：「平成11年度地震関係基礎調査交付金 山崎断層帯に関する調査成果報告書」．兵庫県，91p.

兵庫県 (2001)：「平成12年度地震関係基礎調査交付金 山崎断層帯に関する調査成果報告書」．兵庫県，103p.

今泉俊文・宮内崇裕・堤 浩之・中田 高編 (2018)：「活断層詳細デジタルマップ [新編]」．東京大学出版会，154p・USBメモリー.

地震調査研究推進本部 (1997)：「地震に関する基盤的調査観測計画」．38p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会 (2001)：「長期的な地震発生確率の評価手法について」．46p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会 (2004)：「跡津川断層帯の評価」．28p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会 (2013)：「山崎断層帯の評価」．38p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会 (2015)：「長野盆地西縁断層帯 (信濃川断層帯) の長期評価 (一部改訂)」．34p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会 (2026)：「六甲・淡路島断層帯の長期評価 (一部改訂)」．54p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会長期評価部会 (1999)：「(改訂試案) 長期的な地震発生確率の評価手法について」．74p.

地震調査研究推進本部地震調査委員会長期評価部会 (2026)：「活断層の長期評価手法 (暫定版) 報告書 (追補1)」．4p.

- 加藤茂弘・山口 覚・井口博夫・岡田篤正・先山 徹 (2007) : 山崎断層系、暮坂峠断層の第四紀後期の活動履歴. 人と自然, **18**, 1-12.
- 活断層研究会編 (1991) : 「新編日本の活断層—分布図と資料」. 東京大学出版会, 437p.
- 気象庁 (2016) : 2016年4月16日熊本県熊本地方の地震—近地強震波形による震源過程解析 (暫定) —. <https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/sourceprocess/event/2016041601250547near> (2024年1月確認) .
- Matsubara, M., Ishiyama, T., No, T., Uehira, K., Mochizuki, M., Kanazawa, T., Takahashi, N. and Kamiya, S. (2022): Seismic velocity structure along the Sea of Japan with large events derived from seismic tomography for whole Japanese Islands including reflection survey data and NIED MOWLAS Hi-net and S-net data. *Earth Planets Space*, **74**:171, doi:10.1186/s40623-022-01724-0.
- 松田時彦 (1975) : 活断層から発生する地震の規模と周期について. 地震第2輯, **28**, 269-283.
- 松田時彦 (1990) : 最大地震規模による日本列島の地震分帯図. 地震研究所彙報, **65**, 289-319.
- 松田時彦・岡田篤正 (1968) : 活断層. 第四紀研究, **7**, 188-199.
- 松田時彦・山崎晴雄・中田 高・今泉俊文 (1980) : 1896 年陸羽地震の地震断層. 地震研究所彙報, **55**, 795-855.
- 松多信尚・杉戸信彦・鈴木康弘・中田 高・廣内大助 (2015) : 1:25,000 都市圏活断層図「北条」. 国土地理院技術資料, D1-No. 730.
- 中田 高・今泉俊文編 (2002) : 「活断層詳細デジタルマップ」. 東京大学出版会. DVD-ROM 2 枚・付図 1 葉・60p.
- 尾池和夫・岸本兆方 (1976) : 地震予知テストフィールドとしての山崎断層. 地震予知研究シンポジウム, 83-90.
- 岡田篤正・安藤雅孝 (1979) : 日本の活断層と地震. 科学, **49**, 158-169.
- 岡田篤正・安藤雅孝・佃 為成 (1987) : 山崎断層系安富断層のトレンチ調査. 地学雑誌, **96**, 81-97.
- 岡田篤正・千田 昇・中田 高・石山達也 (2002) : 1:25,000 都市圏活断層図「佐用」. 国土地理院技術資料, D. 1-No. 396.
- 岡田篤正・岡田真介・後藤秀昭・杉戸信彦・廣内大助・松多信尚・八木浩司 (2016) : 1:25,000 都市圏活断層図「津山東部」. 国土地理院技術資料, D1-No. 744.
- 岡田篤正・東郷正美編 (2000) : 「近畿の活断層」. 東京大学出版会, 395p.
- 岡山県 (1996) : 「平成7年度地震調査研究交付金 大原断層に関する調査成果報告書」. 岡山県, 232p.
- Reimer, P. J., Austin, W. E. N., Bard, E., Bayliss, A., Blackwell, P. G., Bronk Ramsey, C., Butzin, M., Cheng, H., Edwards, R. L., Friedrich, M., Grootes, P. M., Guilderson, T. P., Hajdas, I., Heaton, T., Hogg, A. G., Hughen, K. A., Kromer, B., Manning, S. W., Muscheler, R., Palmer, J. G., Pearson, C., van der Plicht, J., Reimer, R. W., Richards, D. A., Scott, E. M., Southon, J. R., Turney, C. S. M., Wacker, L., Adolphi, F., Büntgen, U., Capano, M., Fahrni, S. M., Fogtmann-Schulz, A., Friedrich, R., Köhler, P., Kudsk, S., Miyake, F., Olsen, J., Reinig, F., Sakamoto, M., Sookdeo, A. and Talamo, S. (2020): The IntCal20 Northern Hemisphere Radiocarbon Age Calibration Curve (0-55 cal kBP). *Radiocarbon*, **62**, 725-757.
- 産業技術総合研究所 (2008) : 山崎断層帯の活動性および活動履歴調査. 「活断層の追加・補完調査」成果報告書 No. H19-4, 31p.
- Smith, V.C., Staff, R.A., Blockley, S.P.E., Bronk Ramsey, C., Nakagawa, T., Mark, D.F., Takemura, K., Danbara, T., Suigetsu 2006 Project Members (2013): Identification and correlation of visible tephras in the Lake Suigetsu SG06 sedimentary archive, Japan: chronostratigraphic markers for synchronizing of east Asian/west Pacific paleoclimatic records across the 150 ka. *Quat. Sci. Rev.*, **67**, 121-137.
- 遠田晋次・宮腰勝義・井上大栄・楠建一郎・鈴木浩一 (1995) : 山崎断層系大原断層のトレンチ調査. 地震第2輯, **48**, 57-70.
- 宇佐美龍夫・石井 寿・今村隆正・武村雅之・松浦律子 (2013) : 「日本被害地震総覧 599-2012」. 東京大学出版会, 724p.

吉岡敏和・徳田博明・細矢卓志（2008）：山崎断層帯、琵琶甲断層および三木断層の古地震調査.  
活断層・古地震研究報告，8，281-293.




図3 大原断層古町地点のトレンチスケッチ（遠田ほか，1995に一部加筆）

図の中の年代値は、暦年未校正の放射性炭素同位体年代。緑枠内の年代値は暦年校正後の放射性炭素同位体年代。主な年代値を暦年校正すると以下のようになる。（紀元後は世紀単位で表示。また、紀元前は100年単位で四捨五入して表示）

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| 164±55 (MS1層、北面右上)  | → 17世紀以降       |
| 1299±62 (MS2層、南面中央) | → 7-8世紀        |
| 1468±70 (S1層、北面右端)  | → 6-7世紀        |
| 3019±62 (S2層、北面左端)  | → 約3千4百-3千2百年前 |




図4 大原断層西町A' トレンチ南側壁面（岡山県，1996に一部加筆）  
 右端に断層があり、その上端がG3層の下部を切ってM2層に覆われている。  
 地層の年代値決定に使用したサンプルの暦年補正值は次のとおり。（その他は使用せず）  
 NS01（G3層） 960±40 y. BP → 11-12世紀    NS18（G3層） 1080±70 y. BP → 9-11世紀  
 NS02（G3層） 920±70 y. BP → 11-12世紀    NS04（M2層） 840±60 y. BP → 12-13世紀  
 なお、図中に散在する白い横長の長方形は、壁面崩壊を防ぐための土留めである。






図5 安富断層安志トレンチ（兵庫県，1996に一部加筆）  
 イベントの年代値確定に使用したサンプルの年代値は下記のとおりである。  
 A-1層 AN-23 ( 710±50y. BP) → 13-14世紀  
 B-1層 AN-25 (1800±50y. BP) → 3-4世紀  
 B-3層 AN-15 (2840±50y. BP) → 3千1百-2千9百年前  
 C-2層 AN-33 (7990±50y. BP) → 9千1百-8千9百年前





図6 琵琶甲断層琵琶甲トレンチ（兵庫県，2000）

上が北西壁面、下が南東壁面である。年代値の暦年補正後の値は下表参照。

なお、図中及び下表の矢印左側の年代値は炭素同位体分別補正前の値を示す。

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 250 ± 60yBP → 16 - 18世紀       | 2880 ± 60yBP → 約3千2百 - 3千年前   |
| 3780 ± 40yBP → 約4千3百 - 4千1百年前 | 1350 ± 40yBP → 7 - 8世紀        |
| 3350 ± 40yBP → 約3千6百 - 3千5百年前 | 2240 ± 70yBP → 約2千4百 - 2千2百年前 |
| 1080 ± 70yBP → 9 - 11世紀       |                               |
| 2840 ± 40yBP → 約3千 - 2千9百年前   | 1520 ± 30yBP → 6世紀            |
| 2270 ± 40yBP → 約2千4百 - 2千2百年前 | 2620 ± 30yBP → 約2千8百年前        |
| 1560 ± 60yBP → 5 - 6世紀        | 3650 ± 60yBP → 約4千1百 - 3千9百年前 |
| 1020 ± 40yBP → 11 - 12世紀      |                               |








図8 琵琶甲トレンチの北西壁面断層近傍部分スケッチ  
(産業技術総合研究所, 2008に一部加筆)




図9 山崎断層帯の活動の時空間分布

基準期間：2017-12-01 -- 2018-01-01  
比較期間：2022-12-01 -- 2023-01-01




図10－1 2017年12月から5年間のGNSS連続観測による山崎断層帯・那岐山断層帯周辺における水平ひずみ分布（国土地理院作成）スケールは $0.5 \times 10^{-6}$ 。

基準期間：2012-12-01 -- 2013-01-01  
比較期間：2022-12-01 -- 2023-01-01




図10－2 2012年12月から10年間のGNSS連続観測による山崎断層帯・那岐山断層帯周辺における水平ひずみ分布（国土地理院作成）スケールは $1 \times 10^{-6}$ 。




図10－3 1883年1月から1994年1月までの約100年間の測地観測による山崎断層帯・那岐山断層帯周辺における約100年間の水平ひずみ分布（国土地理院作成）スケールは $10 \times 10^{-6}$ 。

i )




図11－1 山崎断層帯主部周辺の地震活動（気象庁作成）  
（2003年1月1日～2022年12月31日、深さ30 km以浅、M1.0以上）

- i ) 震央分布図
- ii ) i )の領域 a 内のA－B投影の断面図
- iii ) i )の領域 a 内のB－C投影の断面図
- iv ) i )の領域 a 内のM－T図（地震活動経過図）




図11-2 山崎断層帯草谷断層周辺の地震活動（気象庁作成）

（2003年1月1日～2022年12月31日、深さ30 km以浅、M1.0以上）

i) 震央分布図

ii) i)の領域b内のA-B投影の断面図

iii) i)の領域b内のB-C投影の断面図

iv) i)の領域b内のM-T図（地震活動経過図）



i )




図11-3 那岐山断層帯周辺の地震活動（気象庁作成）  
(2003年1月1日～2022年12月31日、深さ30 km以浅、M1.0以上)

- i ) 震央分布図
- ii ) i)の領域c内のA-B投影の断面図
- iii) i)の領域c内のB-C投影の断面図
- iv) i)の領域c内のM-T図（地震活動経過図）




図 11-4 山崎断層帯・那岐山断層帯周辺の地震の発震機構（P波初動解による下半球投影）と圧力軸（上）と張力軸（下）の分布（気象庁作成）  
2003年1月1日～2022年12月31日、深さ30km以浅、M3.0以上





図12－1 山崎断層帯主部北西部区間に平行及び直交断面の震源分布図


(作成：防災科学技術研究所・松原 誠氏)

山崎断層帯主部北西部区間周辺で発生したM1.5 以上の手動再検測済みの地震について、3次元地震波速度構造 (Matsubara *et al.*, 2022) を使用して再決定した震源分布を、P波速度構造図 (Matsubara *et al.*, 2022) 上に描画している。なお、対象とした地震は、断層帯を中心として、断層平行方向には断層長±15 km、断層直交方向には断層長と同程度の長さの範囲において、2000年10月1日から2022年12月31日の期間に発生したものとした。


### 断面位置



### 断層平行断面



### 断層直交断面



Vp [km/s]







図12-2 山崎断層帯主部南東部区間に平行及び直交断面の震源分布図  
(作成：防災科学技術研究所・松原 誠氏)

山崎断層帯主部南東部区間周辺で発生したM1.5以上の手動再検済みの地震について、3次元地震波速度構造 (Matsubara *et al.*, 2022) を使用して再決定した震源分布を、P波速度構造図 (Matsubara *et al.*, 2022) 上に描画している。なお、対象とした地震は、断層帯を中心として、断層平行方向には断層長±15 km、断層直交方向には断層長と同程度の長さの範囲において、2000年10月1日から2022年12月31日の期間に発生したものとした。

## 断面位置



## 断層平行断面



## 断層直交断面






図12-3 草谷断層に平行及び直交断面の震源分布図

(作成：防災科学技術研究所・松原 誠氏)


草谷断層周辺で発生したM1.5以上の手動再検済みの地震について、3次元地震波速度構造 (Matsubara *et al.*, 2022) を使用して再決定した震源分布を、P波速度構造図 (Matsubara *et al.*, 2022) 上に描画している。なお、対象とした地震は、断層帯を中心として、断層平行方向には断層長±15 km、断層直交方向には断層長と同程度の長さの範囲において、2000年10月1日から2022年12月31日の期間に発生したものとした。



## 断面位置



## 断層平行断面



## 断層直交断面





図12-4 那岐山断層帯に平行及び直交断面の震源分布図

(作成：防災科学技術研究所・松原 誠氏)

那岐山断層帯周辺で発生したM1.5以上の手動再検測済みの地震について、3次元地震波速度構造 (Matsubara *et al.*, 2022) を使用して再決定した震源分布を、P波速度構造図 (Matsubara *et al.*, 2022) 上に描画している。なお、対象とした地震は、断層帯を中心として、断層平行方向には断層長±15 km、断層直交方向には断層長と同程度の長さの範囲において、2000年10月1日から2022年12月31日の期間に発生したものとした。




図13 草谷断層トレンチ解釈図（兵庫県，2000）上が南西壁面、下が北東壁面  
 暦年補正後の主な年代値は下記のとおり。なお、図中及び下表の矢印左側の年代値は炭素同位体分別補正前の値を示す。\*を附したものは、上図中に示されていないが、地層の年代決定に使用した年代値サンプルである。

|                              |                             |                      |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| *950±60yBP→11－12世紀（D層）       | 1000±70yBP→10－12世紀（D層）      | 1700±40yBP→5－6世紀（E層） |
| 1880±60yBP→2－4世紀（E層）         | 1880±60yBP→2－4世紀（E層）        | 1850±60yBP→1－4世紀（E層） |
| 1530±40yBP→6－7世紀（G層）         | 1980±70yBP→約2千1百年前－2世紀（E層）  |                      |
| 2120±70yBP→約2千2百－1世紀（E層）     | 2180±70yBP→約2千4百－2千1百年前（E層） |                      |
| 8110±130yBP→約9千4百－8千9百年前（E層） | 2200±50yBP→約2千4百－2千1百年前（G層） |                      |
| 2520±60yBP→約2千8百－2千6百年前（G層）  |                             |                      |



表 7 山崎断層帯主部（北西部区間）の将来の地震発生確率及び参考指標

| 項 目           | 将来の地震発生確率等（注18）   | 備 考                                   |
|---------------|-------------------|---------------------------------------|
| 地震後経過率（注 8）   | 0.5－0.7           | 発生確率及び集積確率は地震調査研究推進本部地震調査委員会（2001）参照。 |
| 今後 30年以内の発生確率 | 0.2％－2％           |                                       |
| 今後 50年以内の発生確率 | 0.3％－3％           |                                       |
| 今後100年以内の発生確率 | 0.8％－6％           |                                       |
| 今後300年以内の発生確率 | 5％－20％            |                                       |
| 集積確率（注 9）     | 0.4％－7％           |                                       |
| 指標(1) 経過年数    | マウス 4 百年－マウス 3 十年 | 地震調査研究推進本部地震調査委員会長期評価部会（1999）参照。      |
| 指標(1) 比       | 0.8－1             |                                       |
| 指標(2)         | 0.1－0.9           |                                       |
| 指標(3)         | 0.4％－7％           |                                       |
| 指標(4)         | 0.02－0.1          |                                       |
| 指標(5)         | 0.0005－0.0006     |                                       |

表 8 山崎断層帯主部（南東部区間）の将来の地震発生確率及び参考指標

| 項 目           | 将来の地震発生確率等（注18）           | 備 考                                   |
|---------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 地震後経過率（注 8）   | 0.4                       | 発生確率及び集積確率は地震調査研究推進本部地震調査委員会（2001）参照。 |
| 今後 30年以内の発生確率 | ほぼ 0％－0.005％              |                                       |
| 今後 50年以内の発生確率 | 0.001％－0.008％             |                                       |
| 今後100年以内の発生確率 | 0.003％－0.02％              |                                       |
| 今後300年以内の発生確率 | 0.03％－0.2％                |                                       |
| 集積確率（注 9）     | ほぼ 0％－0.01％               |                                       |
| 指標(1) 経過年数    | マウス 1 千 3 百年－マウス 1 千 1 百年 | 地震調査研究推進本部地震調査委員会長期評価部会（1999）参照。      |
| 指標(1) 比       | 0.5－0.6                   |                                       |
| 指標(2)         | 0.0005－0.005              |                                       |
| 指標(3)         | ほぼ 0％－0.01％               |                                       |
| 指標(4)         | 0.00008－0.0007            |                                       |
| 指標(5)         | 0.0003                    |                                       |

表 9 草谷断層の将来の地震発生確率及び参考指標

| 項 目           | 将来の地震発生確率等（注18）     | 備 考                                    |
|---------------|---------------------|----------------------------------------|
| 地震後経過率（注 8）   | 0.1－0.3             | 発生確率及び集積確率は地震調査研究推進本部 地震調査委員会（2001）参照。 |
| 今後 30年以内の発生確率 | ほぼ 0 %              |                                        |
| 今後 50年以内の発生確率 | ほぼ 0 %              |                                        |
| 今後100年以内の発生確率 | ほぼ 0 %              |                                        |
| 今後300年以内の発生確率 | ほぼ 0 %              |                                        |
| 集積確率（注 9）     | ほぼ 0 %              |                                        |
| 指標(1) 経過年数    | マイナス3千7百年－マイナス2千9百年 | 地震調査研究推進本部<br>地震調査委員会長期評価部会（1999）参照。   |
| 指標(1) 比       | 0.2－0.4             |                                        |
| 指標(2)         | ほぼ 0                |                                        |
| 指標(3)         | ほぼ 0 %              |                                        |
| 指標(4)         | ほぼ 0                |                                        |
| 指標(5)         | 0.0002              |                                        |

注18：評価時点は全て2026年1月1日現在。「ほぼ0%」は $10^{-3}\%$ 未満の確率値を、「ほぼ0」は $10^{-5}$ 未満の数値を示す。なお、計算に用いた平均活動間隔の信頼度は低い（△）ことに留意されたい。

指標(1) 経過年数：当該活断層での大地震発生の危険率（1年間あたりに発生する回数）は、最新活動（地震発生）時期からの時間の経過とともに大きくなる（BPT分布モデルを適用した場合の考え方）。一方、最新活動の時期が把握されていない場合には、大地震発生の危険率は、時間によらず一定と考えざるを得ない（ポアソン過程を適用した場合の考え方）。

この指標は、BPT分布モデルを適用した場合の危険率が、ポアソン過程を適用した場合の危険率の値を超えた後の経過年数である。値がマイナスである場合は、BPT分布モデルを適用した場合の危険率がポアソン過程を適用した場合の危険率に達していないことを示す。ポアソン過程を適用した場合の危険率は、山崎断層帯主部北西部区間の場合2千2百分の1－1千7百分の1（0.0005－0.0006）であり、いつの時点でも一定である。

BPT分布モデルを適用した場合の危険率は時間とともに増加する。BPT分布モデルを適用した場合の危険率がポアソン過程を適用した場合の危険率に達するには、山崎断層帯主部北西部区間の場合は今後4百年から3十年を要することになる。

指標(1)比：最新活動（地震発生）時期から評価時点までの経過時間をAとし、BPT分布モデルを適用した場合の危険率がポアソン過程を適用した場合の危険率を超えるまでの時間をBとした場合において、前者を後者で割った値（A/B）である。

指標(2)：BPT分布モデルを適用した場合と、ポアソン過程を適用した場合の評価時点での危険率の比。

指標(3)：評価時点での集積確率（前回の地震発生から評価時点までに地震が発生しているはずの確率）。

- 指標(4) : 評価時点以後30年以内の地震発生確率の値をBPT分布モデルでとりうる最大の地震発生確率の値で割った値。
- 指標(5) : ポアソン過程を適用した場合の危険率（1年間当たりの地震発生回数）。

## ＜付録＞

山崎（やまさき）断層帯については、地震調査研究推進本部地震調査委員会（2013）により、それまでに行われた調査結果に基づいた長期評価が公表されているが、山崎断層帯の構成断層の位置形状・活動様式・活動間隔などの違いという観点から活動区間の区分を見直した結果、ここでは断層帯を山崎断層帯・那岐山断層帯に二分し、それぞれを独立した断層帯とする改訂を実施した。

以下に、改訂となった主な項目について、前回の評価と今回の評価の対比表を示す。なお、新たな知見が得られていない部分に関しては、原則、従前の評価を踏襲したものとなっていることに留意されたい。また、評価に当たっては、下表に示す数値のほか、各値を求めた根拠についても改訂していることに留意されるとともに、その詳細については評価文を参照されたい。なお、本評価では、放射性炭素同位体年代（ $^{14}\text{C}$  年代）について、較正曲線（IntCal20, Reimer *et al.*, 2020）を用いて暦年較正プログラム OxCal4.4（Bronk Ramsey, 2009）に基づいた方法によって暦年補正を行っていることから、過去の活動時期の一部が前回の評価（地震調査研究推進本部地震調査委員会, 2013）から変更となっている（注 15）。このため、これらの断層帯では、過去の活動履歴に関する新たな資料が得られていないものの、山崎断層帯主部では、活動時期や活動間隔、地震発生確率に変更が生じていることに留意する必要がある。

**山崎断層帯主部の長期評価についての新旧対比表<sup>※2</sup>**

| 項 目                | 前回の評価<br>(平成 25 年 7 月 19 日)       |   | 今回の評価<br>(令和 8 年 1 月 1 日時点)       |   |
|--------------------|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| 断層帯の位置・形状          | 断層帯の位置<br>(北西部)                   |   | 断層帯の位置<br>(北西部区間)                 |   |
|                    | 北西端<br>北緯 35° 08.4′ 東経 134° 16.0′ | ◎ | 北西端<br>北緯 35° 10.9′ 東経 134° 12.6′ | △ |
|                    | 南東端<br>北緯 34° 53.2′ 東経 134° 43.8′ |   | 南東端<br>北緯 34° 53.5′ 東経 134° 43.8′ | △ |
|                    | (南東部)                             |   | (南東部区間)                           |   |
|                    | 北西端<br>北緯 34° 57.5′ 東経 134° 45.2′ | ◎ | 北西端<br>北緯 34° 57.8′ 東経 134° 45.2′ | △ |
|                    | 南東端<br>北緯 34° 47.0′ 東経 135° 00.8′ |   | 南東端<br>北緯 34° 47.2′ 東経 135° 0.7′  | △ |
|                    | 長さ 約 79 km                        | ◎ | 長さ 約 85 km                        | △ |
|                    | 北西部 約 51 km                       | ◎ | 北西部区間 約 57 km                     | △ |
|                    | 南東部 約 31 km                       | ◎ | 南東部区間 約 31 km                     | △ |
|                    | 地下における断層面の位置・形状<br>幅 約 20 km      | ○ | 地下における断層面の位置・形状<br>幅 18 km 程度     | △ |
| 1 回のずれの量と平均活動間隔    | 1 回のずれの量<br>(北西部)                 |   | 1 回のずれの量<br>(北西部区間)               |   |
|                    | 2－5 m 程度 (左横ずれ成分)                 | △ | 2－6 m 程度 (左横ずれ成分)                 | △ |
|                    | 平均活動間隔<br>(北西部)                   |   | 平均活動間隔<br>(北西部区間)                 |   |
|                    | 約 1 千 8 百－2 千 3 百年                | △ | 1 千 7 百－2 千 2 百年程度                | △ |
| 将来の活動区間及び活動時の地震の規模 | (北西部)                             |   | (北西部区間)                           |   |
|                    | 地震の規模 M7.7 程度                     | △ | 地震の規模 M7.8 程度                     | △ |
|                    | ずれの量 2－5 m 程度 (左横<br>ずれ成分)        | △ | ずれの量 2－6 m 程度 (左横<br>ずれ成分)        | △ |

|                          |                   |   |                    |   |
|--------------------------|-------------------|---|--------------------|---|
| 今後 30 年<br>以内の地震<br>発生確率 | (北西部)<br>0.09%－1% | b | (北西部区間)<br>0.2%－2% | b |
|--------------------------|-------------------|---|--------------------|---|

草谷断層の長期評価についての新旧対比表<sup>※2</sup>

| 項 目               | 前回の評価<br>(平成 25 年 7 月 19 日)                                                      |   | 今回の評価<br>(令和 8 年 1 月 1 日時点)                                                      |        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 断層帯の<br>位置・形<br>状 | 断層帯の位置<br>北東端<br>北緯 34° 47.3′ 東経 135° 00.1′<br>南西端<br>北緯 34° 43.6′ 東経 134° 53.1′ | ◎ | 断層帯の位置<br>北東端<br>北緯 34° 47.2′ 東経 135° 00.6′<br>南西端<br>北緯 34° 43.6′ 東経 134° 53.2′ | △<br>◎ |
|                   | 地下における断層面の位置・形状<br>幅 約 15 km                                                     | ○ | 地下における断層面の位置・形状<br>幅 13 km 程度                                                    | △      |
| 過去の活<br>動時期       | 活動 1 (最新活動)<br>4 世紀以後、12 世紀以前                                                    | ○ | 活動 1 (最新活動)<br>5 世紀以後、12 世紀以前                                                    | ○      |

那岐山断層帯の長期評価についての新旧対比表<sup>※2</sup>

| 項 目                         | 前回の評価<br>(平成 25 年 7 月 19 日)                                                    |   | 今回の評価<br>(令和 8 年 1 月 1 日時点)                                                  |        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 断層帯の<br>位置・形<br>状           | 断層帯の位置<br>西端<br>北緯 35° 06.9′ 東経 133° 53.1′<br>東端<br>北緯 35° 09.1′ 東経 134° 13.7′ | ○ | 断層帯の位置<br>西端<br>北緯 35° 7.6′ 東経 133° 54.1′<br>東端<br>北緯 35° 9.3′ 東経 134° 12.9′ | △<br>△ |
|                             | 長さ 約 32 km                                                                     | ○ | 長さ 約 29 km                                                                   | △      |
| 1 回のず<br>れの量と<br>平均活動<br>間隔 | 平均活動間隔<br>2 万 4 千－5 万 3 千年程度                                                   | △ | 平均活動間隔<br>2 万 3 千－4 万 8 千年程度                                                 | △      |

対比表に示した(◎、○、△、▲)及び(a、b、c、d)については信頼度を示す。それぞれの詳細については、注 3 及び注 7 を参照のこと。

<sup>※2</sup> 変更が生じた項目のうち、代表的なもののみ表示。